

Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS-Fin, IV)

LÄÄKITYKSEEN LIITTYVÄT HAITTAVAIKUTUKSET (edeltävän viikon aikana)

Pvm ja aika _____

ID: _____

Kaavakkeen täytti: potilas / läheinen / hoitaja / lääkäri

A. TAHATTOMAT LIIKKEET (DYSKINESIAT)

(Tiedot perustuvat haastatteluun, tutkimustilanne voi lisätä tahattomia liikkeitä)

Kesto: Kuinka suuren osan tahattomat liikkeet vievät päiväaikaisesta valveaikaajasta?

- 0 Ei esiinny lainkaan.
- 1 1–2 5%.
- 2 26–50 %.
- 3 51–75 %.
- 4 76–100 %.

Haitta

- 0 Ei lainkaan haittaavia.
- 1 Lievästi haittaavia.
- 2 Kohtalaisesti haittaavia.
- 3 Vaikeasti haittaavia.
- 4 Täysin invalidisoivia.

Tahattomien liikkeiden kivuliaisuus: Kuinka kivuliaita tahattomat liikkeet ovat?

- 0 Ei lainkaan kivuliaita.
- 1 Hieman kivuliaita.
- 2 Kohtalaisen kivuliaita.
- 3 Huomattavan kivuliaita.
- 4 Erittäin kivuliaita.

Aamuisin esiintyvä dystonia *(lihasjänteiden lisääntyminen, joka vääntää esim. nilkkaa poikkeavaan asentoon)*

- 0 Ei
- 1 Kyllä

B. TILANVAIHELUK

Ovatko off-vaiheet ennakoitavissa suhteessa lääkkeenottoajankohtaan?

0 Ei.

1 Kyllä.

Ovatko off-vaiheet riippumattomia lääkkeen ottoajankohdasta?

0 Ei.

1 Kyllä.

Tulevatko off-vaiheet yhtäkkiä, esim. muutamassa sekunnissa?

0 Ei.

1 Kyllä.

Kuinka suuren osan off-vaiheet vievät keskimäärin päiväaikaisesta valvellaoloajasta?

0 Ei esiinny lainkaan.

1 1–25 %.

2 26–50 %.

3 51–75%.

4 76–100 %.

C. MUUT KOMPLIKAATIOT

Onko potilaalla ruokahaluttomuutta, pahoinvointia tai oksentelua?

0 Ei.

1 Kyllä.

Onko potilaalla inihäiriöitä, esimerkiksi unettomuutta tai liiallista uneliaisuutta?

0 Ei.

1 Kyllä.

Onko potilaalla oireista ortostatismia (*tuleeko oireita, jos verenpaine laskee seisomaan noustessa*)?

0 Ei.

1 Kyllä.